

Triáž pacientov na ambulantné angiologické vyšetrenie počas pandémie COVID-19:
(MUDr. Andrej Džupina, MBA, hlavný odborník MZSR pre ŠO angiológia)

Angiologické ambulancie v súčasnej epidemiologickej situácii vykonávajú **všetky indikované** angiologické vyšetrenia, vrátane neinvazívnych vyšetrovacích metód (DUS, D-PPG, CW a pod). Je odporúčané objednávať pacientov na vyšetrenie na konkrétnu dobu (preferenčne telefonicky, mailom), tak aby nedochádzalo k prítomnosti viac ako troch pacientov v čakárni súčasne (jeden pacient prichádza, jeden odchádza a jeden je na vyšetrení).

Vstup do ambulancie je, ak je to priestorovo možné, zabezpečený cez vstupný filter, kde sa vykonáva orientačný skrining pacientov a zdravotníckeho personálu vstupujúceho do zdravotníckeho zariadenia bezkontaktným meraním telesnej teploty a anamnézou klinických príznakov ochorenia (horúčky, nový kašeľ, dyspnoe novovzniknuté, myalgie, únava, strata čuchu alebo chute, príp. hnačka u detí).

Všetci pacienti vstupujúci do priestorov ambulancie musia mať počas vyšetrenia rúško príp. chirurgickú masku a dezinfikovať si ruky. Ambulancie sú vybavené barierovými osobnými ochrannými prostriedkami ako sú masky(chirurgické rúška), príp. respirátory rôzneho stupňa ochrany (N95, FFP2, FFP3), rukavice, plášte, čiapky, zástery, dezinfekcia rúk virucídnymi prostriedkami. Pre bežné vyšetrenie pacienta bez podozrenia na pozitivitu COVID-19 postačuje ochranné rúško a jednorazové rukavice.

Je upravená prevádzková doba a počet ošetrovaných pacientov vzhľadom k potrebe častej dezinfekcie povrchov, používaniu germicídnych žiaričov a bezpečnej likvidácii odpadu.

Sú využívané všetky možnosti telemedicíny (fotografie, videohovory a pod.) vrátane predpisovania receptov a poukazov formou e-receptov.

Tabuľka 1: Diagnózy ktoré je potrebné ošetrovať ambulantne bez odkladu:

Kategória	Diagnóza
1. vyšetrenie nemá byť odložené	akútna končatinová ischémia
	kritická končatinová ischémia
	klinické podozrenie na závažnú stenózu extrakraniálnych mozgových ciev
	klinické podozrenie na závažnú aneurizmu abdominálnej aorty
	akútna hĺbková žilová trombóza (v celom rozsahu končatín)
	akútna tromboflebitída
	akútny uzáver dialyzačnej AV fistuly
	akútne alebo progredujúce ulkusy končatín (artériovej, žilovej, neuropatickej,... etiologie)
	akútna progresia lymfedémov (komplikácie)

Tabuľka 2: Diagnózy, ktoré znesú odklad vyšetrenia v angiologických ambulanciách:

Kategória	Diagnóza
2. vyšetrenie môže byť odložené	chronická ischemická choroba dolných končatín v štádiu klaudikácií
	chronická vénová choroba, bez progresie stavu
	chronický lymfedém DK alebo HK
	sklerotizácie žíl dolných končatín